



AXION

EC FERTİLİZER

EC FERTİLİZER

# AXION

## 15-30-15+ME

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

|  | w/w    |
|--|--------|
| Toplam Azot (N)  | % 15   |
| Amonyum Azotu (N)  | % 7,3  |
| Nitrat Azotu (N)   | % 4,2  |
| Üre Azotu (N)  | % 3,5  |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )           | % 30   |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                             | % 15   |
| Suda Çözünür Bor (B)   | % 0,05 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)                          | % 0,03 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)                          | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)                         | % 0,07 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo)   | % 0,03 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı)                          | % 0,05 |
| EDTA Şelatın stabil olduğu pH aralığı ( Cu- Fe -Mn - Zn ) : pH 2 – pH 11 ) |        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bakanlık Tescil No |  |
| Bakanlık Lisans No |  |
| Üretim Tarihi      |  |
| Parti No           |  |



NET Ağırlık  
(NET Weight)  
**25kg**

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ANOCA KİMYA SANAYİ TİC. A.Ş.  
AŞAĞIĞBA MAH. TOPTANCILAR BİRLİĞİ SK.  
NO:104/9 DÜŞEMEALTI / ANTALYA  
A.KURUMLAR V.D. 0700869665



*Anoca*

| ÜRÜN<br>PRODUCT<br>ПРОДУКТ  | UYGULAMA DÖNEMİ<br>APPLICATION PERIOD<br>СРОК ПРИМЕНЕНИЯ  | YAPRAKTAN<br>LEAVES<br>ЛИСТ<br>(100L Su) | TOPRAKTAN<br>SOIL<br>ПОЧВЫ<br>(1 DA) |
|---|---|--|--------------------------------------|
| - Sera ve Açık Alan Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek vb.)<br>-Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Melon, Watermelon, Zucchini, Strawberry etc.<br>-Помидор, перец, баклажан, огурак, дыня, арбуз, цуккини. Клубника и т. Д.  | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasat dönemine kadar 4-5 kez uygulanır.<br>The plants are applied 4-5 times from the 4-5 leaf period until the harvest period.<br>Применяется от 4 -5 раз в период от 4 -5 листа растения до сбора урожая | 200-400 g                                | 1,5-3 kg                             |
| -Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Zeytin, Elma, Armut, Ayva, Fındık, Badem, Ceviz, Kestane vb.)<br>-Peach, Apricot, Cherry, Plum, Olive, Apple, Pear, Quince, Hazelnut, Almond, Walnut, Chestnut etc.<br>- Персик, абрикос, вишня, слив а, олива, яблоко, груша, айва, лесной орех, миндаль, грецкий орех, каштан и т. Д.  | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.<br>It is applied 3-4 times with an interval of 20 days intervals from the fruit set.<br>Применяется от 3 -4 раз с интервалом в 20 дней от момента периода завязывания плодов.             | 300-500 g                                | 2-4 kg                               |
| -Tüm Endüstri Bitkileri, Baklagiller, Yem Bitkileri ve Tahıllar (Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Pamuk, Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya Kanola, Buğday, Arpa, Pirinç vb.)<br>- Corn, Sunflower, Tobacco, Cotton, Chickpea, Lentil, Bean, Soy Canola, Wheat, Barley, Rice etc..<br>- Кукуруза, подсолнечник, табак, хлопок, нут, чечевица, фасоль, соевый канолла, пшеница, ячмень, рис и т. Д. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasat dönemine kadar 4-5 kez uygulanır.<br>The plants are applied 4-5 times from the 4-5 leaf period until the harvest period.<br>Применяется от 4 -5 раз от 4 -5 листа растения до периода сбора урожая  | 200-400 g                                | -                                    |
| -Tüm Yumru Bitkiler (Soğan, Sarımsak, Havuç, Patates, Şalgam, Şeker Pancarı vb.)<br>- Onion, Garlic, Carrot, Potato, Turnip, Sugar Beet etc.<br>- Лук, чеснок, морковь, картофель, репа, сахарная свекла и т. Д.  | Yumru oluşumundan hasada kadar 2-3 kez uygulanır.<br>It is applied 2-3 times from tuber formation to harvest.<br>Применяется 2 -3 раза от момента образования клубней до сбора урожая.  | 200-400 g                                | 1,5-3 kg                             |
| -Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye<br>- Grape, Banana, Pomegranate, Fig, Citrus<br>- Виноград, банан, гранат, рис. Цитрусовые  | Yetiştirme periyodu boyunca 20 gün ara ile 4-5 kez uygulanır.<br>It is applied 4-5 times with an interval of 20 days during the growing period.<br>Применяются 4 -5 раз с интервалом 20 дней в течение вегетационного периода.                        | 300-500 g                                | 2-4 kg                               |
| -Kesme Çiçekçilik<br>- Cut Flowers<br>- Срезанные цветы   | Gelişme döneminde 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.<br>It is applied 3-4 times with 20 days intervals during the development period.<br>Применяется 3 -4 раза с интервалом 20 дней в период развития культуры.  | 200-400 g                                | 1,5-3 kg                             |

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

#### UYARILAR

- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Gübreleme esnasında eldiven ve gözlük kullanınız.
- Teneffüs edildiği takdirde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

#### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmaması vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

#### DEPOLAMA

- Ürünü serin, kuru ve havadar bir yerde muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Depolarda sigara içmeyiniz, ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.
- Depolama Sıcaklığı: 0-45 °C olmalıdır

#### TÜKETİM BİLGİLERİ

Tescil No, Lisans No, Parti No, Üretim Tarihi ambalaj üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

#### WARNINGS

- Keep away from children and food.
- Never exceed the appropriate dosage rate and Use only where necessary.
- It is recommended to use fertilizer by analyzing soil and / or leaf analysis.
- Avoid contact with eyes, face and skin. In case of contact rinse with plenty of water.
- Use gloves and goggles during fertilization.
- If inhaled and an unexpected effect occurs, consult your doctor.
- Do not use the used empty packages for other purposes and dispose of them.

#### COMPANY DECLARATION

The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, the problems that may arise due to misuse and mixing are not guaranteed by the company. The user is responsible for any problems (toxicity, residues, ineffectiveness, etc.) caused by improper use and storage.

#### STORAGE

- Keep the product in a cool, dry and airy place, do not expose it to sunlight.
- Do not smoke, do not approach with fire, keep away from explosive flammable materials and other chemicals in warehouses.
- Storage Temperature: must be 0-45 °C.

#### CONSUMPTION INFORMATION

Registration Number, License Number, Lot Number, Production Date are on the package. The expiry date is 5 (five) years from the date of manufacture.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить вдали от детей и продуктов питания
- Никогда не превышайте рекомендованную норму внесения.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы или листовой диагностики.
- Во время внесения удобрения, избегайте контакта с глазами, лицом и кожей. В случае контакта, пораженный участок необходимо промыть с большим количеством воды.
- Используйте перчатки и защитные очки во время внесения удобрения.
- Проконсультируйтесь с врачом при вдыхании и наблюдении неожиданного эффекта
- Не используйте пустые пакеты для других целей и утилизируйте их.

#### Объявления Компании

Производитель гарантирует качество продукта при использовании в соответствии с его рекомендациями. Проблемы, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и смешивания, не входят в гарантию компании. Пользователь несет ответственность за любые проблемы (токсичность, остатки, неэффективность и т.д.) вызванные неправильным использованием и хранением.

#### Хранение

- Храните продукт в холодном, сухом и проветриваемом месте, не подвергая его воздействию солнечных лучей.
- Не курите в складах, не подходите с огню, держите его подальше от других взрывоопасных химических веществ.
- Температура хранения : должна быть 0-45 °C

#### Информация о потреблении

Регистрационный номер, Номер лицензии, Номер партии, Дата производства указаны на упаковке. Срок годности продукта 5 (пять) лет с даты производства.

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ANOCA KİMYA SANAYİ TİC. A.Ş.  
AŞAĞIOBA MAH. TOPTANCIAR BİRLİĞİ SK.  
NO:104/9 DÖŞEMEALTI / ANTALYA  
A.KURUMLAR V.D. 0700869665



ÜRETİCİ FİRMA



ANOCA KİMYA SAN. TİC. A.Ş.  
Aşağıoba Mahallesi Toptancılar Birliği Sokak  
No:104/9 Döşemealtı - ANTALYA - TÜRKİYE  
Tel: +90 242 335 40 50  
www.anoca.com.tr

NET Ağırlık  
(NET Weight)  
**25kg**